

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE CON MICROELEMENTI

Bottiglie da Kg **1**
Taniche da Kg **6**



COME AGISCE

- Migliora lo sviluppo del budello pollinico
- Incrementa l'allegagione
- Previene l'acinellatura nei vigneti
- Previene e cura il "mal del cuore" nella barbabietola da zucchero
- Previene la spaccatura nelle coste del sedano
- Riduce sensibilmente la cascola in olivicoltura
- Soddisfa le rilevanti esigenze di boro nelle colture di rape, cavoli, erba medica, asparagi, tabacco, cotone, girasole, drupacee e pomacee
- Favorisce il trasporto degli zuccheri

La presenza di enzimi, aminoacidi, proteine e carbonio organico sottoposti a lenta bio-elaborazione garantisce un rapido ed elevato assorbimento cuticolare, stomatico nonché una rapida traslocazione nei tessuti.

La presenza congiunta di boro e molibdeno favorisce i processi di riproduzione e la sintesi delle proteine e della clorofilla.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) tot. 1%, Azoto (N) organico 1%, Boro (B) 2%, pH 6.5, sostanza organica con peso molecolare nominale <50 KDa minimo 30%, Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 0,09% (stabile nell'intervallo di pH 4 - 9), Ferro (Fe) 0,28%, Molibdeno (Mo) 0,20%, Carbonio (C) organico di origine biologica 8%, Batteri della rizosfera (*Pseudomonas* spp., *Bacillus* spp., *Attinomiceti*), Funghi saprofiti (*Trichoderma* spp.).

Componenti organici: estratto di lievito e emoglobina solubile, carbone attivo e aggiunta di enzimi estratti da brodi di fermentazione.

COMPONENTI ORGANICI

Enzimi (cellulasi, proteasi, amilasi, lipasi), betaina, zuccheri acidi, acidi poliacarbossilici.

Concime minerale azotato di partenza: urea.

COLTURA	DOSI/HA E MODALITÀ	PERIODO
Carciofo, sedano, pomodoro, melanzana, peperone, anguria, cetriolo, melone, zuccina, insalata, prezzemolo, ecc.	Kg. 3 per via radicale e/o fogliare	Inizio fioritura ripetere dopo 10 - 15 giorni
Agrumi, olivi, vite, actinidia, pesco, ciliegio, melo, pero, albicocco, susino, ecc.	Kg. 6 per via radicale e/o fogliare	Inizio fioritura
Floricole ed ornamentali	Kg. 6 per via radicale e/o fogliare	Alla pre-formazione bocciolo ripetendo dopo 10 - 15 giorni
Barbabietola da zucchero, carota, ravanella, sedano, cavolo	Kg. 3 per via radicale e/o fogliare	Alle prime 4 - 6 foglie e dopo 20 - 30 giorni
Girasole, colza, mais, cotone, arachide	Kg. 3 per via radicale e/o fogliare	Alle prime fasi vegetative

