

# ERGOFERT MAGNESIO

ergofert

CONCIME CEE

Bottiglie da Kg 1  
Taniche da Kg 6



## COME AGISCE

- **Prevenzione e cura di magnesio-carenze;**
- **Migliora la qualità di frutti e ortaggi.**
- **Azione antistress e biostimolante;**
- **Migliora la fotosintesi clorofilliana;**
- **Migliora la sintesi dei carotenoidi;**
- **Migliora l'azione sinergica con il Ca nella produzione di pectina e di fitine;**
- **Migliora l'assorbimento del fosforo e del potassio;**
- **Migliora i rapporti Mg/K e Mg/Ca sia nel terreno che sulla pianta stessa;**
- **Migliora lo sviluppo radicale;**
- **Diminuisce l'accumulo di nitrati nelle parti commestibili degli ortaggi, pericolosi per la salute umana;**
- **Diminuisce lo stress dovuto alla siccità.**

Il magnesio è un elemento molto mobile all'interno della pianta e le colture ortive e fruttifere sono buone consumatrici. Le carenze di magnesio si notano soprattutto nei climi piovosi con terreni: - sabbiosi - acidi - permeabili - abbondantemente concimati con potassio.

La Mg-deficienza si manifesta con clorosi assai varie nei differenti tipi di piante alle quali seguono evidenti difficoltà a sintetizzare antociani e gravi defogliazioni alla fine dell'estate. La Mg carenza inizia dalle foglie più vecchie alla base dei rami e prosegue in senso acropeto. È attenuata dalla scarsa illuminazione ed è accentuata da una abbondante piovosità.

Le clorosi magnesiache e le disfunzioni vegetali che ne conseguono possono essere evitate intervenendo con ERGOFERT MAGNESIO, che oltre a prevenire la carenza specifica, in virtù del suo contenuto in enzimi e azoto e carbonio organico, costituisce una riserva alimentare aiutando così la pianta a raggiungere un equilibrato sviluppo vegetativo e la potenzialità produttiva tipica della specie.

## COMPOSIZIONE

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 13% da MgCl<sub>2</sub>

COLTURA	DOSI/HA e MODALITÀ	PERIODO
Frutticoltura	3 Kg/ha fogliare e radicale da ripetere per almeno 4 volte	Da prefioritura ad inizio allegagione
Ortaggi	3 Kg/ha per via fogliare o radicale da ripetere per almeno 3 volte	In pieno campo a partire dalle prime fasi di sviluppo
Vite	6 Kg/ha per via fogliare o radicale ripetere per almeno 3 volte	Dall'allegagione ad invaiatura
Vivai	2-3 Kg fogliare Si consigliano 2 - 3 interventi	Dal risveglio vegetativo fino alla dormienza

